

AVORTUL MEDICAMENTOS - PACHET DE SERVICII

Ce este intreruperea de sarcina prin tratament medicamentos?

Este o metodă de a intrerupe o sarcina folosind medicatie în loc de o procedură chirurgicală prin aspiratie se poate aplica sarcinilor pana la 9 saptamani.

Cea mai utilizata formula pentru avortul medical este combinatia Mifepristone + Misoprostol.

Cum se va realiza intreruperea sarcinii prin tratamentul medicamentos?

Protocolul este urmatorul:

PAS 1: Prima consultatie la cabinetul medical : Medicul nostru va realiza un consult prin care va stabili starea de sanatate a femeii (fizica si psihica). Acest consult presupune in general o consultatie cu medicul ginecolog si o ecografie pentru a confirma varsta exacta a sarcinii intrauterine. Dupa ce pacienta a inteles toate informatiile oferite de catre medic referitor la intreruperea sarcinii prin tratament medicamentos inclusiv contraindicatiile si este de acord in a continua cu procedura, medicul ii va administra in cadrul clinicii « pilula de avort » Aceasta este de fapt un pachet cu doua tipuri de medicamente : o tableta de Mifepriston care se ia in cabinet cu medicul si al doilea medicament format di tablete care se iau oral sau intravaginal (la indicatia dr.) acasa la pacienta la o ora stabilita cu medicul curant.

NOTA: Pacientele vor avea in permanenta un numar de telefon de la clinica pentru contact in cazul in care au nevoie de asistenta sau informatii suplimentare.

Nr.Tel :0720.958.847

PAS 2: Administrarea prostaglandina (cel de-al doilea medicament) Inca de la prima consultatie din clinica, pacienta afla cum si cand trebuie administrat prostaglandina- pastile, la o ora indicata de medic, intre 24-48 h de la administrarea Mifepristone. La un interval de timp dupa administrarea orala a tabletelor ,intre 10 minute si 2 ore.. pot surveni contractii si/sau sangerari iar dupa administrarea lui, in interval de 2-8 ore majoritatea femeilor pierd sarcina. Contractiile, sub forma de crampe, pot creste si descreste in intensitate, timp in care embrionul este eliminat. Fiind foarte mic, de multe ori trece neobservat fiind inglobat in cheaguri de sange.

Recomandare! Medicii nostri recomanda clientelor sa ramana acasa dupa administrarea prostaglandinei, si dupa caz si administrarea unui antialgic(daca intervin dureri) algocalmin, nurofen, la care nu este alergica pacienta.

PAS 3: Consultatia post intrerupere de sarcina. A doua consultatie se face intre 7-14 zile de la acest moment cand ,ecografic se va stabili succesul metodei !

Consultatiile se fac cu programare !! telefonic sau personal !